덴큐®정

음성 설명서


(옥수수불검화정량추출물) | 일반의약품 | 분류번호 | 231 (치과구강용약)

원료약품 및 분량 (1정 중)

■유효성분 : 옥수수불검화정량추출물(KHP) (총 β-시토스테롤로서 7.0mg)·····35.0mg
■첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호, 청색2호
■첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
■기타 첨가제 :무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파글로스 클리어(97W19196), 오파드라이 200 주황색(200F630014), 오파드라이 흰색(OY-S-7223), 전분글리콜산나트륨, 코포비돈, 콜로이드성이산화규소, 탤크, 히드록시프로필셀룰로오스

성 상

이 약은 주황색의 원형 필름코팅정입니다.



효능·효과

치주 치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료
※쉬운용어정리 : 치은염(잇몸염), 치주(치아주위조직)

용법·용량

성인 : 초기량으로는 옥수수의 불검화정량추출물로서 1회 70mg(2정), 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.
유지량으로는 1회 35mg(1정), 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약의 구성성분에의 과민반응 환자
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산(아스피린) 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제 [비스테로이드성 소염제(항염증제)]에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
2) 이 약은 콜레스테롤류 약물(예 : 스테로이드 호르몬제 등)의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의합니다.
3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고(웃돈다고) 판단되는 경우에만 투여합니다.)

※5030411-1220707

4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알레르기 경력이 있는 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 또는 약사와 상의하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 가벼운 완하작용(변을 부드럽게 보게 함)을 일으킬 수 있습니다.
2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.
3) 국내에서 이 약의 유효성 및 안전성을 평가하기 위하여 치주질환 환자를 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약을 복용(초기 4주간 1일 3회, 1회 2정 복용, 4주부터 12주까지 1일 3회, 1회 1정 복용, 총 12주간 복용) 한 환자 72명에서 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상반응은 다음과 같습니다. 코인두염(2건), 치아농양(치아고름집), 복통(배아픔), 치아파절, AST증가, ALT 증가, 녹내장, 고지혈증, 팔다리 통증, 이를 뽑음(발치)(각 1건)
4) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.　　2) 장기간 계속하여 복용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광(햇볕)을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(PTP, 케이스)로 인하여 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
※ 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품(알약)에 포장물(알루미늄호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 정제(알약)만 복용하십시오.
※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.

포장단위

120정/상자(10정/PTP X 12), 240정/상자(120정/상자 (10정/PTP X 12) X 2), 360정/병

○사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
○ 이 설명서는 2022년 7월 7일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지 (www. ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
○의약품 부작용 신고·피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

ILDONG 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2
공장 : 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030411-1220707