덴큐® 플러스정

(옥수수불검화정량추출물 · 후박75%에탄올연조엑스(5→1))

일반의약품

분류번호	231 (치과구강용약)

원료약품 및 분량 (1정 중)

- 유효성분 : 옥수수불검화정량추출물(KHP)(총 스테롤로서 7mg) 35.0mg,
  후박75%에탄올연조엑스(5→1)(별규) 70.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 2호, 황색 4호, 황색 5호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 주황색(200F630014), 오파드라이 흰색(21K58794), 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 포비돈

성 상

주황색의 원형 필름코팅정



효능 · 효과

치주치료 후 치은염, 경 · 중등도 치주염의 보조치료
※ **쉬운용어정리 :** 치은염(잇몸염), 치주(치아주위조직)

용법 · 용량

1. **초기량 :** 1회 2정, 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.
2. **유지량 :** 1회 1정, 1일 3회 식전에 경구투여(복용)합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약의 구성 성분에 과민반응 환자
2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
2) 이 약은 콜레스테롤류 약물의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의합니다.
3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.)
4) 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

※1215301-1220121

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 가벼운 완하작용(변을 부드럽게 보게 함)을 일으킬 수 있습니다.
2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.
3) 국내에서 만성치주염 환자 55명을 대상으로 실시한 임상시험결과, 이 약과의 인과관계에 상관없이 보고된 이상반응을 발현부위별로 분류하면 다음과 같습니다.
   (1) 소화기계 : 소화불량, 과민성대장염 환자에서의 증상 악화, 구강궤양
   (2) 간 및 담도계 : ALT 증가, 총 빌리루빈 증가
   (3) 피부 및 부속기계 : 얼굴 및 목의 가려움
   (4) 대사 및 영양계 : 얼굴부종
   (5) 기타 : 청력이상, 잇몸통증
4) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 국내 임상시험결과 옥수수불검화정량추출물 단일제와 후박75%에탄올연조엑스를 함유한 복합제 간의 유의성 있는 유효성 차이는 없었습니다.
2) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
3) 장기간 계속하여 복용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

포장단위

120정/상자(10정/PTPx12), 240정/상자{(10정/PTPx12)x2}, 300정/병

※사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
※이 설명서는 2022년 1월 21일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.
※의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제조자
(주)제뉴원사이언스
세종특별자치시 전의면 산단길 245

제조의뢰자
ILDONG 일동제약주식회사
본사 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2
공장 : 경기도 안성시 공단1로 25
소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※1215301-1220121