폭: 486mm(폭)(±1.0mm )

일동제약

# 에폴민

## 카타플라스마

(디클로페낙에폴아민)

지퍼부분부터 눌러서 밀폐 보존하여 주십시오

국내최초
붙이는
디클로페낙에폴아민

## 강력한 소염진통 효과

- 타박상
- 삠
- 테니스엘보우

5매 | 9cm×13cm
일동제약(주) | 일반의약품

대화제약 | 주

COOL~
쿨링 파스

지퍼부분부터 눌러서 밀폐 보존하여 주십시오

## 일반의약품 정보

**이 약을 사용하기 전 반드시 아래 내용을 확인하세요.**

**[유효성분]** 1매(9cm X 13cm) 중

디클로페낙에폴아민(별규) ·····150.4mg (디클로페낙으로써 108.33mg)

**[효능 · 효과]** 다음 질환 및 증상의 진통 · 소염(항염)

1) 상완골(위팔뼈) 상과염(테니스엘보우 등) 2) 외상(상처)성 염증 : 타박상, 삠(염좌)

**[용법 · 용량]** 성인 및 16세 이상 소아

- 상완골(위팔뼈) 상과염 : 1회 1매, 1일 2회(아침, 저녁) 환부(질환 부위)에 부착하여 사용한다(최대 14일 이내로 사용한다).
- 타박상, 삠(염좌) : 1회 1매, 1일 1회 환부(질환 부위)에 부착하여 사용한다(최대 3일 이내로 사용한다). 증상에 따라 가능한 단기간 사용한다.

**[사용상의 주의사항]** 사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하세요.

**1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.**
1) 이 약 및 이 약 성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자 2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드소염(항염)진통제에 과민반응 환자 3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드소염(항염) 진통제에 대한 천식(비스테로이드소염(항염) 진통제 등에 의한 천식 발작을 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식 발작을 일으킬 수 있다) 4) 임신 5개월이 경과한 임부 5) 수유부 6) 16세 미만의 소아 7) 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 피부(삼출(진물)피부염, 습진, 감염된 병변(병에 의한 몸의 변화), 화상, 상처 등)에는 사용하지 말 것. 8) 소화궤양환자 9) 관상동맥(심장 동맥)우회술 수술 환자

**2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**
디클로페낙 제제나 비스테로이드소염(항염)진통제를 국소적으로 적용하거나 복용하지 말 것.

**3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.**
비스테로이드소염(항염)진통제를 복용 후 졸림 또는 중추신경계 장애를 경험한 적이 있는 환자의 경우에는 운전 또는 기계조작을 삼간다. 그러나 이 약과 같은 국소 적용제제가 이러한 장애를 일으킬 가능성은 적다.

**4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**
1) 기관지 천식 환자(중증 천식발작을 일으킬 수 있다) 2) 피부의 감염증을 불현성화(증상이 나타나지 않는)할 우려가 있으므로 감염을 수반하는 염증에 대해 이 약을 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 복용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여할 것. 3) 만성질환 (퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또 환자 상태를 충분히 관찰하고 이상반응 발현(드러냄)에 유의할 것. 4) 임부 : 이 약을 임신기간 중에 사용한 경험은 충분하지 않다. 동물 실험에서 생식독성이 있는 것으로 알려졌다. 사람에 대한 위험성여부는 알려져 있지 않다. 따라서 이 약을 임신 1기 및 2기에 사용하여서는 안되고, 임신 5개월 이후의 임산부에서는 금기이다. 임신 3기에 프로스타글란딘 합성 억제제를 사용하는 경우, 자궁수축을 저해하고 임신 및 분만이 지연될 수 있고, 산생아의 심폐독성 (동맥관 조기 폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 양수과소증을 수반하는 신생아의 신기능저하, 산모 및 신생아의 출혈 및 산모의 부종(부기) 등이 나타날 수 있다. 비스테로이드성 소염(항염) 진통제(NSAIDs)는 프로스타글란딘 매개 작용기전으로 인해 난포파열을 방해하거나 지연시킬 수 있으며, 이는 일부 여성에게 가역적 불임을 일으킬 수 있다. 따라서 임신이 어렵거나 불임검사를 받고 있는 여성의 경우 이 약을 포함한 NSAIDs 계열 약물의 사용중단을 고려해야 한다. 5) 수유부: 모유중으로의 이행이 보고되어 있으며, 이로 인해 영아에서 심각한 이상반응의 발생이 우려되므로, 수유부에 대한 약물 투여를 고려해야 한다. 6) 전신에 나타나는 효과는 낮을 것으로 예상되나 신장, 심장(울혈심부전 등) 또는 간장애 환자, 소화성궤양, 위장관 출혈 · 천공(뚫림) 또는 염증창자병, 출혈체질 병력이 있는 환자에는 신중히 사용한다. 7) 고령 환자의 경우 연령이 낮은 환자보다 NSAIDs 관련 중증 심혈관계, 위장관, 및/또는 신장 이상 반응의 위험성이 더 높다. 고령자에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응 발현(드러냄)에 특히 유의한다. 8) 이 약은 메틸파라벤 및 프로필파라벤을 함유하고 있어 알레르기반응을 나타낼 수 있으므로 주의한다. 9) 알레르기 질환 환자에서 기관지연축이 나타날 수 있다. 10) 고혈압, 부종(부기) 환자 11) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게 신중히 투여한다.

**5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것.**
1) 피부 : 가려움, 붉음, 홍반(붉은 반점), 발진, 적용부위의 반응, 알레르기피부염, 박탈피부염, 스티븐슨-존슨증후군, 독성표피괴사용해가 나타나는 경우 2) 과민반응 : 드물게 아나필락시스모양증상 (두드러기, 호흡곤란 등)이 나타나는 경우 3) 권장기간 동안 사용한 후에도 증상이 개선되지 않는 경우

**6. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항**
1) 진통소염(항염)제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의할 것. 2) 눈 및 점막부위에 사용하지 말 것. 3) 피부표면의 손상(짓무름, 습진, 피부염증, 화상, 상처 등)이 있는 부위에는 사용하지 말 것. 4) 밀봉붕대법으로 사용하지 말 것. 5) 동물을 대상으로한 전임상시험자료에서 사람에서 특별한 위험이 있다는 결과는 없으나, 디클로페낙에폴아민 및 에폴아민 단일 성분을 랫트 및 토끼에 경구 투여하였을 때 배아독성 및 배아치사율을 증가시켰다. 6) 이 약의 임상시험 및 시판후 조사 결과 신장에서의 NSAIDs가 일부 환자에서 루프 이뇨제(예: 푸로세미드) 및 치아짓계 이뇨제의 나트륨뇨배설 효과를 감소시킬 수 있음이 확인되었다. 이 약물들과 NSAIDs를 병용(함께 복용)투여하는 동안 항고혈압 효과를 포함한 이뇨 효과를 확인해야 하며, 신기능 악화의 징후를 면밀히 관찰해야 한다. 7) 이 약을 포함한 NSAIDs는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 아는 치명적일 수 있다. 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 NSAIDs는 상승작용을 나타낼 수 있다. 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 출혈의 위험이 높아질 수 있으므로 쿠마린계 항응혈제와 병용(함께 복용)투여시 혈액 응고능 검사 등 관찰을 충분히 한다. 자혈을 방해하는 약물(예: 와파린), 항혈소판제(예: 아스피린), 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 및 세로토닌 노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRI)와 이 약을 함께 병용(함께 복용)하는 환자에서 출혈 징후가 있는지 관찰해야 한다. 이러한 이상반응은 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 또한, 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다.

음성 설명서

**7. 저장상의 주의사항**
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 3) 의약품의 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.

**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

**[사용기한]** 포장재 오른쪽 하단 표시일까지

**[첨가제]**

- 첨가제(보존제) : 메틸파라벤 5.85mg, 프로필파라벤 11.70mg
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
- 기타 첨가제 : l-멘톨, 농글리세린, 디프로필렌글리콜, 디히드록시알루미늄아세테이트수화물, 밀착포, 부직포, 부틸히드록시톨루엔, 산화티탄, 소르비탄올레에이트, 에데트산나트륨수화물, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 카올린, 타르타르산, 페릭옥사이드, 폴리아크릴산 액, 폴리아크릴산나트륨, 폴리에틸렌테레프탈레이트 세파레이터

**[포장단위]** 5매/포 **[성상]** 연한 분홍색 또는 분홍색의 점착성 고체를 부직포 위에 도포하고 뒷면에 밀착포를 부착한 특유한 향기를 가진 카타플라스마제

**[안전한 사용방법]** 1. 건선(마른비늘증) 피부, 건성 피부, 알레르기성 피부 등 피부가 약한 분은 사용에 유의하시기 바랍니다. 2. 접착력이 강하므로 떼어낼 때 미온수에 적당히 불려서 떼내시면 좋습니다. 3. 햇볕에 노출되는 부위에 부착하신 경우에는 붕대나 의복 등으로 부착 부위를 가려주시면 광과민성으로 인한 피부 이상반응을 예방할 수 있고, 사우나, 온찜질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 주의하시기 바랍니다. 4. 질환부위에 장시간(용법용량 이상) 부착하지 말고, 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 가급적 피하시기 바랍니다. 5. 피부에 부착된 제품은 재사용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

○본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ○기타 자세한 사항은 본 내용 작성일자 (2026년 09월 29일) 이후 변경된 내용은 대화제약(주) DDS사업팀(02-6716-1078)으로 문의하시기 바랍니다. ○**본 제품 사용 후 부작용 (이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 자발적인 부작용 보고 및 피해 구제를 문의할 수 있습니다.** ○의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. 개정일 : 2026.09.29

판매자 ILDONG 일동제약주식회사 ※2135701-260929
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2 고객상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)

제조자 대화제약 | 주 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495

제조번호

사용기한
(연. 월. 일)까지

8 806456 014316

비닐류 OTHER