판테놀케어 연고

(D-판테놀)

ILDONG

일반의약품

Dexpanthenol 덱스판테놀 5% 함유

덱스판테놀은 **피부자극을 방지**하고, **상처가 건강한 피부로 회복**되는데 도움을 줍니다.

Heise R, et al. Cutan Ocul Toxicol. 2019 Sep;38(3):274-278.

원료약품 및 분량(1g 중)

- 유효성분 : D-판테놀(USP) ····· 50mg
- 첨가제(보존제) : 메틸파라벤 1mg, 프로필파라벤 0.5mg
- 기타 첨가제 : 글리세릴스테아레이트SE, 농글리세린, 디메티콘, 백색바셀린, 세토스테아릴알코올, 스테아릴알코올, 정제수, 카보머호모폴리머, 토코페롤아세테이트, 트롤아민, 폴록사머, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜400

성상

흰색의 연고제

효능 · 효과

상처, 화상, 찢긴 상처(수유기 중의 유두균열(갈라짐) 등), 욕창, 급 · 만성 피부염, 습진, 피부궤양, 기저귀발진, 햇볕에 탄 데(일광피부염)의 보조치료

용법 · 용량

1) 상처를 청결히 한 후 환부에 1일 1~수회 바른다.
2) 수유기 중의 유두균열에는 매 수유 직후 유두에 바른다.

※1800570-1250801

사용상의 주의사항

사용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 사용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오.
   1) 이 약 및 부형제에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 감염성 또는 삼출성 피부병 환자
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
   1) 눈과의 접촉을 피하십시오.
   2) 수유 중에 균열된 유두를 치료하기 위해 이 약을 도포했을 경우, 모유 수유 전에 닦아내야 합니다.
3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
   1) 이상반응
      다음의 약물이상반응은 자발적 보고에 의한 것으로, 사용가능한 데이터로부터 빈도 추정이 불가능합니다.
      - 알레르기 반응과 알레르기성 피부 반응(예. 접촉피부염, 알레르기성 피부염, 가려움증, 홍반, 습진, 발진, 두드러기, 피부자극, 수포)이 보고되었습니다.
   2) 기계 조작 및 운전 능력에 미치는 영향은 관찰되지 않았습니다.
   3) 이 약과 다른 약물, 다른 제형과의 상호 작용은 알려져 있지 않습니다.
4. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
   2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위

60g/튜브

※제품 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※이 설명서는 2025년 8월 1일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(**www.ildong.com**)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제조자 : 태극제약㈜
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

제조의뢰자 : 일동제약주식회사
본사 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2
공장 경기도 안성시 공단1로 25
www.ildong.com
고객상담실 : (전화)080-022-1010(수신자부담)

※1800570-1250801