다양한 소화불량 증상엔

일동 편속액

과식·체함·소화불량
속쓰림·설사·복통

스틱포장

일반의약품

원료약품 및 분량 1포(20그램) 중

- 유효성분 : 건강(KP) 0.18g, 진피(KP) 0.58g, 창출(KP) 0.30g, 울금(KP) 0.36g, 회향(KP) 0.18g, 정향(KP) 0.23g, 육두구(KP) 0.18g, l-멘톨(KP) 0.003g, 산사(KP) 1.34g, 감초(KP) 0.42g, 작약(KP) 0.42g, 현호색(KP) 0.42g
- 기타 첨가제 : 믹스후르츠향(22012234), 시트르산, 아스파탐, 정제수, 탄산수소나트륨, 프락토올리고당

성 상

알루미늄 호일에 들어 있는 특이한 맛과 냄새를 지닌 갈색의 액제

효능 · 효과

식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체함, 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 토사, 위통, 복통(배아픔), 산통, 위산과다, 속쓰림

용법 · 용량

1일 3회 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

○만 15세 이상 : 1회 1포
○만 11세 이상 – 만 15세 미만 : 1회 2/3포
○만 8세 이상 – 만 11세 미만 : 1/2포
○만 5세 이상 – 만 8세 미만 : 1/3포
○만 3세 이상 – 만 5세 미만 : 1/4포
○만 1세 이상 – 만 3세 미만 : 1/5포

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 경고

1) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않는다. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직하다.

※1800534-1250519

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 2) 고혈압 환자, 노인, 심장장애 또는 신장장애 환자, 부종(부기) 환자
 3) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,치과의사,약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 이 약을 복용함으로써 요량이 감소하고, 얼굴과 손발이 붓고, 손이 굳어지고, 혈압이 오르며, 두통 등의 증상이 나타날 경우
 2) 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우(저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이 나타날 수 있다)
 3) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
 4) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
 3) 장기간 계속하여 복용하지 말 것.
 4) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

6. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

6 포/상자((20g/포×6)), 20g/포

※ 제품 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 약국개설자, 안전상비의약품 판매자 및 의약품 판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2025년 5월 19일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 등 검색(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

제조자 : (유)한풍제약
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301, 봉동로 705

제조의뢰자 : 일동제약㈜
본사 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2
공장 : 경기도 안성시 공단1로 25 www.ildong.com
고객상담실 : (전화)080-022-1010 (수신자부담)

※1800534-1250519