


아로나민골드®

정은 신경과 근육에 중요한 역할을 하는 활성비타민B1(푸르설티아민)과 비타민B₂, B₆, B₁₂가 모두 활성형으로 처방되어 있으며 여기에 비타민E, C를 보강시킨 종합활성비타민제입니다. 아로나민골드정은 신경통, 관절통(요통, 어깨결림 등)을 비롯하여 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 임신·수유부에게도 좋은 영양제입니다.



활성 비타민이란?


활성 비타민은 다른 비타민에 비해 장으로 흡수가 잘되고 높은 혈중 농도를 나타내며 신경과 근육 조직으로 이행이 잘 되는 비타민을 말합니다.



또한 지속적으로 작용하며, 보효소로의 전환율이 높아 체내에서 이용되기가 쉽습니다. 비타민B군이 보효소로 바뀌는 인체기관은 간장이기 때문에 특히 간장이 나쁜 분들에게는 활성형 비타민의 투여가 더욱 바람직합니다.

- 흡수가 좋은 비타민B1 유도체 푸르설티아민은 신경과 근육에 이행하기 쉬운 활성비타민으로 지속적으로 효과를 나타냅니다.
- 푸르설티아민과 같이 신경과 근육의 작용에 필수적인 활성 비타민B₂, B₆, B₁₂가 균형있게 배합되어 육체피로, 신경통에 효과적입니다.
- 히드록소코발라민은 체내 저류성이 좋고, 신경에 작용하는 활성비타민B₁₂입니다.

에너지 생성과정과 아로나민골드정의 작용점



1. 육체피로에 -

아로나민골드정은 신경과 근육에 쌓인 피로소(젖산)를 분해, 배설시켜 피로를 없애주고 에너지 생성을 원활히 하여 건강에 활력을 높여줍니다. 몸이 피로하다, 웬지 몸이 나른하다, 전날에 너무 애쓴 탓인지 근육이 아프다, 이런 분께는 아로나민골드정을 권해드립니다.



2. 눈의 피로에 -

수정체의 두께를 조절하는 기능을 담당하는 모양체근의 수축 운동은 하루에 무려 10만번으로 눈의 피로는 바로 모양체근의 피로입니다. 아로나민골드정의 4가지 활성비타민은 모양체에 작용하여 피로소를 분해시킵니다.



3. 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)에 -

아로나민골드정에 함유된 활성비타민 B₁, B₆, B₁₂는 신경계 비타민으로서 신경과 근육에 오래 머무르면서 상한 신경의 재생을 도와주며 신경·근육의 대사를 촉진하고 운동을 활발하게 해주므로 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)에 효과를 발휘합니다.



4. 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 -

병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)나 에너지의 소비량이 많은 경우에는 종합 활성 비타민의

보급이 필요합니다. 아로나민골드정의 활성

비타민 B군은 장에서 잘 흡수되어 피곤한

몸의 구석구석에 잘 도달합니다.



• 원료약품의 분량(Composition) 1정 중(Each tablet contains)

푸르설티아민(Fursultiamine)(활성비타민B₁, KP) 50.0mg
 리보플라빈부티레이트(Riboflavin butyrate)(활성비타민B₂, KP) 2.5mg
 피리독살포스페이트수화물(Pyridoxal phosphate)(활성비타민B₆, KP) 2.5mg
 히드록소코발리민아세트산염(Hydroxocobalamin acetate)(활성비타민B₁₂, KP) 5.22μg
 아스코르브산(직타용)(Ascorbic acid for D.C.) (아스코르브산으로서 70.0mg)(비타민C, 별규) 72.2mg
 토코페롤아세테이트2배산(Tocopherol acetate)(비타민E, KP)
 (토코페롤아세테이트로서 20.0mg) 40.0mg

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색2호, 황색203호

• 효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆, E, C의 보급 : 육체피로, 임신·수유기, 병중·
 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기

○ 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)

○ 각기 ○ 눈의 피로

• 용법·용량 성인 1회 1정씩 1일 2회 복용하십시오.

Aro-G

Aro-G

• 성상 이 약은 적색의 필름코팅정입니다.

• 사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 3개월 미만의 젖먹이

3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 고옥살산뇨증환자(hyperoxaluria : 요증에 과량의 수산염이 배설되는 상태)

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 맑은 변, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.

6) 풀산(엽산)이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

※ 개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 마십시오.

습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

※ 제품 개봉 또는 취급시에 포장재(케이스, 알루미늄호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

※ 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물(알루미늄호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 정제(일약)만 복용하시기 바랍니다.

• 저장방법 기밀용기

• 포장단위 10, 30, 100, 120, 150, 300, 500정

※ 5030123-1141219

※ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

※ 이 설명서는 2014년 12월 19일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

ILDONG 일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

(전화) 02-526-3114

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실:(전화) 080-022-1010(수신자부담)

아로나민®

골드 정

육체피로, 눈의피로, 신경통-